

MRSA positiv prøve

Afvigelse fra standardplan?

- Er sundhedspersonale eller bor sammen med sundhedspersonale
- Er beboer på plejehjem eller døgninstitution/modtager hjemmehjælp
- Er barn under 2 år, eller der er barn under 2 år i husstanden
- Er gravid
- Har tidligere været i behandling for MRSA bærertilstand
- Er hjemløs
- Har daglig kontakt til svin
- Har risikofaktorer som fremmedlegeme (fx sonde, urinvejskateter) eller hudforandringer (fx eksem, kroniske sår)
- MRSA er mupirocin resistent (Bactroban næsesalve kan ikke bruges)

Ja

Nej

Klinisk prøve (fx sårpodning)

Infektionen behandles. (Ved behov for antibiotisk behandling, kontakt evt. KMA.)

Når infektionen er overstået, huden er hel og borgeren har været uden antibiotika i min. 7 dage, **undersøges for MRSA bærertilstand** med podninger fra næse, svælg og perineum.

Bærertilstand (positiv i næse, svælg og/eller perineum)

Tilbyd **1. behandling af MRSA bærertilstand** til borgeren samt husstandskontakter/kæreste og evt. nær familie. Lav recept på Bactroban næsesalve 2 % (3 gram) til hvert cpr.nr. og angiv "MRSA-pakke" i bemærkningsfeltet. Apoteket udleverer så vederlagsfrit næsesalven og 1 flaske med 250 ml klorhexidinsæbe. Kuren varer 5 dage med næsesalve x 3 dgl. og helkropsvask x 1 dgl.

Kontakt KMA Hvidovre (MRSA VidenCenter) 38 62 24 29 (planområde byen og syd) eller KMA Herlev 38 68 67 12 (planområde nord og midt) og aftal videre forløb

Negativ

Positiv

1 mdr. efter endt behandling podes alle, der har fået behandling, fra næse, svælg og perineum.

Positiv

Ingen eradikationsbehandling, men podes igen fra næse, svælg og perineum **6 mdr. efter påvisning af MRSA**

Kun dem, der tidligere har fået påvist MRSA, kontrolpodes igen fra næse, svælg og perineum **6 mdr. efter endt behandling.**

Positiv

Negativ

Borgeren afsluttes som MRSA fri