

Instruks for prøvetagning ved udredning for MRSA (*Methicillin resistente Staphylococcus aureus*) hos personer på plejehjem og lignende institutioner


Materialer til prøvetagning:

- Pødepinde og prøveglas (eSwab).
- Blå prøvesedler.
- Evt. urinprøvesæt Monovette.
- Evt. ekspektorat æsker.

Materialet rekvireres i SAP bestillingsmodulet.

Procedure for håndtering af pødepind og prøveglas (eSwab):

- "Børsten" på pødepinden må ikke berøres.
- Efter podning placeres pødepinden forsigtigt i prøveglasset – uden at ramme ydersiden eller kanten af prøveglasset.
- Væsken i prøveglasset må ikke hældes ud – det er et transportmedie.
- Pødepinden føres helt ned i bunden af prøveglasset, inden pødepinden knækkes over prøveglassets kant. Herefter sættes låget på (Bemærk: låget på eSwab er pt. lyseblåt).



Der skal som minimum podes fra næse, svælg og perineum. Hvis personen har sår, eksem, fremmedlegemer eller tegn på infektion fra andre lokalisationer, skal der suppleres med podninger herfra.

Procedure for prøvetagning:

Podning fra næse (én podepind)

- Podepinden føres med et fast tryk rundt et par gange på indersiden af næsefløjen – max. 1 cm op i næsen.
- Der podes fra begge næsebor med samme podepind.

Podning fra svælg (én podepind)

- Podepinden føres ned til først den ene tonsil og derefter den anden tonsil med samme podepind. Podepinden føres med et fast tryk rundt på tonsillerne – kan hos nogle personer virke ubehageligt og udløse brækreflekser.

Podning fra perineum

- Podepinden føres med et fast tryk på langs og tværs rundt på huden mellem genitalia externa og anus.

Podning fra sår, eksem, pus, ekspektorat, urin, stomi og/eller fremmedlegemer

- Ved sår føres podepinden ind under sårskorpens kant, eller sårskorpen løftes af, og der podes fra sårbunden. Der anvendes én podepind til hvert sår.
- Ved eksem podes fra den afficerede hud – også selv om der ikke aktuelt er infektion. Der anvendes én podepind.
- Hvis der er pus i sår, øje, eller øre tages en prøve heraf. Der anvendes en podepind pr. lokalisation.
- Ved fremmedlegemer (f.eks. dræn, sonde og katetre) podes fra indstiksstedet.
- Hvis der er en stomi, skal der tages en prøve fra hudkanten af stoma.
- Hvis der er symptomer på pneumoni eller produktiv hoste, skal der tages et ekspektorat, der opsamles i opsamlingsboks med gult skruelåg.
- Hvis der er symptomer på urinvejsinfektion eller der ligger et urinvejskateter, skal der tages en urinprøve, der opsamles i Monovette prøveglas.

Udfyldelse af blå prøveseddel

- Der skal udfyldes én prøveseddel pr. prøveglas.
- Label (nummer/stregkode) fra prøveseddel skal sættes på langs af prøveglasset.

Prøvesedlen udfyldes med:

1. MRSA VidenCenter447, Hvidovre Hospital angives som rekvirent.
2. Kliniske oplysninger fx MRSA-screening i forbindelse med smitteopsporing, udbrud eller kontrolpodning.
3. Husk at skrive, hvis personen er i antibiotisk behandling og med hvilket præparat.
4. Patientnavn, **cpr. nummer**, prøvedato og samt **navn og adresse på den institution/afdeling**, hvor prøven er taget.
5. MRSA – NB: Kun et kryds pr. prøveseddel.
6. Hvis afkrydsningsfeltet "*andet*" benyttes skal "*andet*" i det blanke felt ovenover udfyldes med lokalitet.

1. MRSA VidenCenter447 angives som rekvirent.

Label fra prøveseddel skal sættes på langs af prøveglasset.

Labels påsættes på langs af prøveglasset

9 272 62 38. 9 272 62 38. 9 272 62 38.

KUN EN UNDER-SØGELSE PR. SEDDEL

Ekspektorat ☐ D+R ☐ TB-mik ☐ Pneumoni ☐ KOL

Ledvæske ☐ D+R Fra:

Podninger

☐ Næse ☐ Øre h/v ☐ Clatrice

☐ Svælg ☐ Sår ☐ Absces

☐ Bihule ☐ Decubitus ☐ Malt

☐ Øje h/v ☐ Hud ☐ Perineum

Andet: ☐ Rectum

MRSA ☒ KUN ET KRYDS

Næse ☐ Svælg ☐ Perineum ☐ Sår ☐ Andet

Fæcesundersøgelser

☐ Udlandsrejse, hvor

Patogene tarmbakterier

☒ KUN ET KRYDS

☐ Diaré erhvervet i DK

☐ Rejse diaré

☐ Blodig diaré

☐ Diaré hos børn (<7 år)

Parasitter i fæces

☐ Orm + æg + cyster

☐ Berneormæg / analftryk

Virus i fæces

☐ Rota- og adenovirus

Andet:

☐ Enterikelbiopsi / Helicobacter pylori

Gonokokker ☐ Cervix ☐ Urethra ☐ Rectum ☐ Svælg ☐ Øje

Vaginalpodn. ☐ D+R ☐ Gær ☐ Trichomonas

Urin ☐ D+R ☐ Cystitis ☐ Recidiverende cystitis

☐ KAD ☐ Gravid ☐ Pyelonefritis

5. Kun et kryds pr. seddel.

6. Hvis feltet **andet** afkryd-
ses, skal feltet **andet** oven-
over også udfyldes med det
aktuelle prøvemateriale, der
kan være urin, ekspektorat,
stomi eller lign.

2. Kliniske oplysninger kan være
screening ifm. smitteopsporing
eller smitteudbrud.

3. Husk at skrive, hvis personen får
antibiotika og hvilket præparat.

4. Prøvedato, patientnavn, institutionens
navn og afdeling, samt patientens CPR nr.

Opbevaring af prøver

Prøverne opbevares på køl indtil forsendelse.

Forsendelse af prøver

- Prøver kan afleveres på opsamlingssteder i kommunen, jf. skrivelse udsendt til alle pleje-
hjem/institutionsledelser d. 2/10-17.
For oplysninger om opsamlingsstederne, som indgår i Regionens kørselsordning, kontakt
Region Hovedstaden - Enhed for Logistik & Forsyning tlf. **38 66 69 00**.
- Alternativt med post til:
Hvidovre Hospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, afsnit 445,
Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.