

Sulfamethoxazol med trimetoprim "SAD"

[Virksomme stoffer](#) | [Anvendelse](#) | [Dosering](#) | [Bivirkninger](#) | [Bør ikke anvendes](#) | [Særlige advarsler](#) | [Brug af anden medicin](#) | [Graviditet](#) | [Amning](#) | [Trafik](#) | [Bloddonor info](#) | [Doping](#) | [Virkning](#) | [Håndtering og holdbarhed](#) | [Lægemiddelformer](#) | [Hjælpesoffer](#) | [Tilskud](#) | [Tilskud, udlevering, Pakninger og priser](#) | [Substitution](#) | [Identifikation og foto](#)

Sulfamethoxazol med trimethoprim "SAD" er et antibiotikum. » [Sulfonamid og trimethoprim i kombination](#).

Virksomme stoffer

Sulfamethoxazol, Trimethoprim.

Anvendelse

Sulfamethoxazol med trimethoprim "SAD" anvendes til:

- Behandling af infektioner med mikroorganismer, som kan påvirkes af sulfamethoxazol og trimethoprim, fx:
 - » [lungebetændelse](#), fremkaldt af protozoen *Pneumocystis jiroveci*
 - specielle tilfælde af » [urinvejsinfektioner](#)
 - akut forværring af kronisk bronkitis.
- At forebygge mod » [lungebetændelse](#) med *Pneumocystis jiroveci* hos AIDS-patienter.

Dosering

Findes som tabletter.

- Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
- **Urinvejsinfektioner og akut forværring af kronisk bronkitis**
 - **Voksne og børn over 12 år.** Sædvanligvis 2 tabletter 2 gange i døgnet.
 - **Børn 6 uger-12 år.** 40 mg sulfamethoxazol og 8 mg trimethoprim pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.
- **Forebyggelse af lungebetændelse med *Pneumocystis jiroveci***
 - **Voksne og børn over 12 år.** 1-2 tabletter i døgnet.
- **Behandling af lungebetændelse med *Pneumocystis jiroveci***
 - **Voksne og børn over 12 år.** 4 tabletter 4 gange i døgnet.
- **Bemærk:**
 - Nedsat dosis ved dårligt fungerende nyrer.
 - Nedsat dosis ved dårligt fungerende lever.
 - Tabletterne skal tages i forbindelse med et måltid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%)	Feber. Betændelse på tungen, kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré. Hudkløe, hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%)	Pletter på røntgenbillede af lungerne, åndenød, hoste. Påvirkning af knoglemarven med øget tendens til infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, træthed og svimmelhed pga. mangel på røde blodlegemer. Forhøjet mængde kalium i blodet, nedsat mængde kalium i blodet, nedsat mængde natrium i blodet. Nældefeber, småblødninger i hud og slimhinder.
Sjældne (0,01-0,1%)	Tyktarmsbetændelse, betændelse i bugspytkirtlen, leverbetændelse, dårligt fungerende lever. Hjertebetændelse. Øget tendens til blødninger pga. mangel på blodplader. Ledsmerter, muskelsmerter. Hallucinationer, hjernehindebetændelse, besvær med at styre arme og ben. Alvorlig hudreaktion. Alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok). Betændelsestilstand i nyren. Regnbuehindebetændelse, årehindebetændelse (uveitis) i øjet, nærsynethed, øresusen (tinnitus).
Meget sjældne (under 0,01%)	Påvirkning af ekg, hæmmet vejrtrækning. Vrangforestillinger (psykose).

Bør ikke anvendes

Sulfamethoxazol med trimethoprim "SAD" bør ikke anvendes:

- Ved » **overfølsomhed** over for:
 - sulfonamider
 - vanddrivende midler (furosemid, thiazider)
 - sulfonylurinstoffer (insulinfrigørende midler)
 - visse øjenmidler (carboanhydrasehæmmere)
 - para-aminobenzosyre
 - visse lokalbedøvende midler, fx benzocain.
- Hvis man tidligere har haft alvorlige bivirkninger af behandling med sulfonamider.
- Til for tidligt fødte børn og børn under 6 uger.
- Ved visse former for blodsygdomme.
- Ved meget dårligt fungerende lever
- Ved meget dårligt fungerende nyrer.

Særlige advarsler

Sulfamethoxazol med trimethoprim "SAD" skal anvendes med forsigtighed:

- Ved dårligt fungerende nyrer
- Ved samtidig behandling med kaliumbesparende vanddrivende midler bør blodets indhold af kalium kontrolleres jævnligt.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

- Sulfamethoxazol med trimethoprim "SAD" øger virkningen af:
 - phenytoin (epilepsimiddel)
 - warfarin (blodfortyndende)
 - sulfonylurinstoffer (tabletter mod diabetes)
 - methotrexat (middel mod leddegigt)
 - lamivudin (HIV-middel).
- Samtidig behandling med ciclosporin (middel ved organtransplantation) kan øge påvirkningen af nyrerne. Epilepsimidler samt midler mod malaria (proguanil, pyrimethamin) kan i kombination med Sulfamethoxazol med trimethoprim "SAD" medføre mangel på folsyre (B-vitamin).
- Sulfamethoxazol med trimethoprim "SAD" må ikke tages samtidig med methenamin (middel mod urinvejsbetændelse).

Graviditet

Må ikke anvendes. » [Der er forskel mellem anbefalingerne i medicin.dk og indlægssedlen.](#)

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.» [Der er forskel mellem anbefalingerne i medicin.dk og indlægssedlen.](#)

Midlet kan påvirke nedbrydning af folsyre hos barnet. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker bakteriedræbende på grund af såvel sulfamethoxazol som trimethoprim. Sulfamethoxazol hæmmer dannelsen af folsyre, som er nødvendig for bakteriernes vækst, og trimethoprim hæmmer dannelsen af folininsyre, som er nødvendig for bakteriernes stofskifte.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 400 mg sulfamethoxazol og 80 mg trimethoprim.

Downloaded fra "minmedicin.dk" 21. oktober 2014