

Information vedrørende almindelige vaccinationer, når du/dit barn har kronisk tarmbetændelse

Alle børn og unge med Crohns sygdom og Colitis Ulcerosa bør følge det danske børnevaccinationsprogram, som er gratis for alle (se figur). Det er en god idé at tage en samtale med lægen på Børne- og Ungeafdelingen om dit barns/dine vaccinationer.

Husk, at der er særlige forholdsregler for:

1. Børn under 5 år.
2. Børn og unge i immundæmpende behandling (azathioprin og biologisk medicin) ved MFR-vacciner og andre levende vacciner.
3. Unge der skal rejse til lande, som ikke har et sundhedsvæsen som i Danmark.

Vaccinationsanbefalinger

Alle børn og unge med Crohns sygdom og Colitis ulcerosa anbefales følgende vaccinationer via egen læge og kan gives uanset, hvilken medicinsk behandling man er i for sin sygdom:

1) Den årlige influenzavaccine (gratis).

2) Livmoderhalskræft/endetarmskræftvaccine (HPV-vaccination):

Både drenge og piger tilbydes HPV-vaccine, når de bliver 12 år. HPV-vaccination er en del af det danske børnevaccinationsprogram.

Det anbefales at alle børn/unge med Crohns sygdom og colitis ulcerosa vaccineres med HPV vaccine.

3) Lungebetændelsesvaccine (Udvidet pneumokok vaccine) (gratis): Som en del af det danske børnevaccinationsprogram tilbydes alle børn i alderen 3, 5 og 12 måneder en 13-valent vaccination mod pneumokokker, der beskytter imod 13 typer af pneumokok-bakterier. Man skal være opmærksom på at den første pneumokok-vaccine blev indført i 2007, og derved finde ud af om man/ens barn er vaccineret med denne eller ej.

- Hvis du/dit barn ikke er vaccineret: gives både den 13- og 23-valente pneumokok-vaccine med 8 ugers mellemrum.

- Hvis du/dit barn er vaccineret efter 2007 i det danske vaccinationsprogram, så anbefales en 23-valent pneumokok-vaccine (den beskytter mod yderligere 23 forskellige typer af pneumokok-bakterier). Inden den 23-valente pneumokok-vaccine gives, skal der måles antistoffer i blodet mod de første 13 typer af pneumokok-bakterier.


Hvis blodprøven viser, at kroppen **har** svaret på vaccinen, da kan barnet vaccineres med den 23-valente vaccine hos egen læge.

Hvis blodprøver viser, at kroppen **ikke har** svaret på vaccinen, da skal der først vaccineres med den 13-valente pneumokok-vaccine og 8 uger senere med den 23-valente vaccine hos egen læge.

4) Smitsom leverbetændelsesvaccine (Hepatis B-vaccine) (selvbetaling):

I Danmark er hepatitis B ikke en del af børnevaccinationsprogrammet. Det anbefales alligevel, at børn og unge med Crohns og colitis ulcerosa bliver Hepatitis B-vaccineret, som beskytter mod smitsom leverbetændelse. Vaccinationen gives hos egen læge. Der vaccineres i alt tre gange: dag 0, efter 1 måned og efter 6 måneder. Man kan ydermere vælge en vaccine, der beskytter både mod Hepatitis A og B.

Det danske børnevaccinationsprogram (2020)



Hvis der er tvivlsspørgsmål, så spørg næste gang du/I kommer på Børne- og Ungeafdelingen.