



*Til alle kliniske afdelinger
Amager og Hvidovre Hospital
og Læger i praksis, Medicinsk Optageområde Syd*

Afsnit 339

Telefon 4013 6709

Mail Lise.Bathum@regionh.dk

Dato: 24. februar 2026

Vedr: Ny analysemetode til Thyroidperoxidase-Ab;P

Den 26. februar 2026 indføres ny metode til bestemmelse af Thyroidperoxidase-Ab;P (NPU20041).

Metodeskiftet indebærer:

Nyt referenceinterval: < 20 kIU/L (beslutningsgrænse).

Beslutningsgrænsen er harmoniseret i Region Hovedstaden for de klinisk biokemiske afdelinger, der anvender den nye metode (dvs. Amager Hvidovre Hospital og Bispebjerg Frederiksberg Hospital).

Kilden til beslutningsgrænsen er leverandøren af analysemetoden. Leverandøren oplyser, at grænseværdien er fastlagt via ROC-analyse, der optimerer testens evne til at skelne thyreoideasyge fra raske.

Referenceintervallet for den hidtidige metode: < 35 kIU/L.

Den nye metode anvender samme analyseprincip (kompetitivt immunoassay) som den hidtidige metode og har samme leverandør. Den nye metode er karakteriseret ved:

- *At være mindre biotin-følsom*
- *Anvende monoklonale antistoffer fremfor polyklonale antistoffer*

For yderligere oplysninger om analysen kontakt venligst: Bent Lind, overlæge dr.med. (bent.struer.lind.01@regionh.dk eller telefon: 2964 9102).

Med venlig hilsen

Lise Bathum

Cheflæge, Ph.d.

Lisbeth Mortensen

Chefbioanalytiker

Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital.